



晴可平®

# 复方醋酸钠林格注射液

说明书

请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用

## 【药品名称】

通用名称：复方醋酸钠林格注射液

英文名称：Compound Sodium Acetate Ringer's Injection

汉语拼音：Fufang Cusuanna Linge Zhushuye

## 【成份】

本品为复方制剂，每1000ml中含氯化钠6.372g，氯化钾0.3g，氯化镁0.204g，醋酸钠3.404g，枸橼酸钠0.588g，葡萄糖酸钙0.672g，无水葡萄糖10.0g。

辅料：盐酸、注射用水。

渗透压摩尔浓度为300~350mOsmol/kg，pH值为5.9~6.2。

## 【性状】

本品为无色的澄明液体。

## 【适应症】

循环血量及组织间液减少时的细胞外液的补充，代谢性酸中毒的纠正。

## 【规格】

(1) 250ml；(2) 500ml

## 【用法用量】

用法：静脉滴注，输入速度通常为15ml/kg/hr以下。

用量：通常成人一次500~1000ml。

根据年龄、症状和体重不同适当增减。

## 【不良反应】

据报道，在201例患者中发现2例不良反应，不良反应发生率为1.0%。主要为心电图ST段降低，心律不齐。大量或快速输液时，出现脑水肿、肺水肿、末梢水肿。

## 【禁忌】

下列情况禁用：

(1) 高钾血症；(2) 高钙血症；(3) 高镁血症；(4) 甲状腺功能低下。

## 【注意事项】

1.本品不以补充能量为目的，当患者的循环动态等达到稳定时，根据患者的状态进行调节，应该根据需要中止本品，改用维持输液或者高能量输液等。

2.下列情况慎用：

(1) 肾功能不全者，因水、电解质调节机能低下，应慎用本品。

(2) 心功能不全患者，输注本品可引起循环血容量增多，心脏负担加重，可能会引起症状加重，应慎重给药。

(3) 高渗性脱水患者，必须补充水分，由于本品含有多种电解质，用后可能使症状加重，应慎用本品。

(4) 由于阻塞性尿路疾患导致尿量减少患者，因水、电解质负荷过量，可能会使症状加重，应慎重给药。

(5) 糖尿病患者，由于抑制葡萄糖向组织的移行，可能会导致高血糖而致症状恶化，应慎重给药。

3.给药前

(1) 输液时应防止感染（患者皮肤和器具要消毒）。

(2) 寒冷时期应温热至体温水平使用。

(3) 本品开封后一次性使用，残留液体不得留作下次使用。

4.输液时应观察血液循环状态及尿量，根据需要调整给药速度。

5.其他注意事项

一般药理试验中，本液按1mg/kg/分钟速度急速输入比格犬体内，输液后不久，因液体中含有醋酸钠，会引起一过性血压轻度降低，心电图R波电位降低和呼吸数增加。

#### 【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。

#### 【儿童用药】

本品尚未开展用于儿童的临床研究。

#### 【老年用药】

高龄患者因心功能、肾功能及糖代谢等生理功能降低，输液时应注意速度缓慢或减量。

#### 【药物相互作用】

1.本品含有钙离子，与枸橼酸和血液混合时可引起凝血。

2.本品遇磷酸根离子和碳酸根离子会生成沉淀，因此不得与含有上述二离子的制剂配伍。

3.本品与头孢匹林钠盐、硫酸阿贝卡星和头孢他啶配合使用时，会使这些抗生素效价下降，故配制后3小时内用完。

4.本品与硫喷妥钠、坎利酸钾混合时，会有沉淀生成和结晶析出。

#### 【药物过量】

尚未明确。

#### 【临床药理】

药代动力学

尚未明确。

#### 【药理毒理】

复方醋酸钠林格注射液为多种电解质（含钠、钾、镁、钙离子）成分组成的复方制剂，用于体内水、电解质平衡的维持和补充。

#### 【贮藏】

密闭保存。

#### 【包装】

三层共挤输液用膜（I）制袋包装。

250ml/袋：40袋/箱；500ml/袋：20袋/箱。

#### 【有效期】

18个月

【执行标准】 国家药品监督管理局药品注册标准YBH17592023

#### 【批准文号】

(1) 250ml: 国药准字H20183077

(2) 500ml: 国药准字H20183076

#### 【上市许可持有人】

企业名称：南京正大天晴制药有限公司

注册地址：南京经济技术开发区惠欧路9号

邮政编码：210038

联系电话：025-85109999

传 真：025-85803122

网 址：www.njcttq.com

#### 【生产企业】

企业名称：南京正大天晴制药有限公司

生产地址：南京经济技术开发区惠欧路9号

邮政编码：210038

联系电话：025-85109999

传 真：025-85803122

网 址：www.njcttq.com